

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
20.12.11 № 939
Регистрационное
удостоверение
№ UA/5574/01/01

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
№ _____

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

КАЛАНХОЭ СОК
(KALANCHOËS SUCCUS)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 1 л препарата содержит сок свежих побегов каланхоэ (*Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers.) (содержание органических кислот в пересчете на кислоту яблочную – не менее 1,2 %) 996,6 мл;
вспомогательное вещество: хлороформ.

Лекарственная форма. Сок для наружного применения.

Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость от светло-коричневого до желтого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие мелкой взвеси.

Название и местонахождения производителя. ЧАО «БИОФАРМА».
Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения ран и язвенных поражений.
Код АТС D03A X.

Каланхоэ сок оказывает противовоспалительное действие, способствует более быстрому очищению от некротических тканей и эпителизации ран и язв. Не раздражает кожу и слизистые оболочки.

Показания к применению.

Каланхоэ сок применяют в хирургической, стоматологической и акушерско-гинекологической практике в составе комплексной терапии.

В хирургической практике каланхоэ сок применяют при лечении ран, которые долго не заживают, трофических язв голени, пролежней, ожогов, в комплексе с другими средствами для подготовки ран к наложению вторичных швов и для пересадки кожи. В стоматологической практике каланхоэ сок применяют при гингивитах (острый диффузный катаральный гингивит, подострые и хронические формы гипертрофического катарального гингивита), при воспалительно-дистрофической форме пародонтоза II-III степени, при рецидивирующем хроническом афтозном стоматите. В акушерско-гинекологической практике сок применяют при ранах промежности, разрывах при родах, при трещинах сосков.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения в период беременности отсутствует. В послеродовой период препарат используют местно при разрывах родовых путей и промежности. Препарат можно применять после каждого кормления грудью при трещинах сосков.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не исследовалась.

Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует.

Способ применения и дозы.

В хирургической практике проводить туалет кожи вокруг раны или язвы, поверхность орошать 1-3 мл сока при помощи шприца через иглу малого диаметра. На рану или язву наложить 4-5 слоев марлевой повязки, обильно смоченных соком каланхоэ. Повязку до очищения патологического очага от некротических масс менять ежедневно, а затем - через день. Прилегающие к ране слои марли снимать после предварительного увлажнения их 3 % раствором перекиси водорода. Кроме полной замены повязки 1 раз в сутки, дополнительно (1 раз в сутки) с помощью шприца хорошо смачивать соком каланхоэ нижние слои марли, а верхние слои при этом снимать.

При наличии гнойных выделений в течение 5-7 дней сок применять на фоне антибактериальной терапии. Средняя продолжительность применения сока – 15-20 дней.

При трещинах сосков после каждого кормления наносить пипеткой несколько капель сока каланхоэ на соски в течение 4-5 дней.

При ранах промежности способ применения такой же, как и в хирургической практике. В стоматологической практике сок применяют в виде аппликаций (марлевых салфеток или ваты, смоченных соком) после предварительной тщательной обработки патологических очагов (перед применением сок подогреть на водяной бане до температуры + 37 °С). Аппликации проводить 3-4 раза в сутки по 20 минут. Курс лечения составляет обычно от 8 до 15 дней.

Препарат можно применять в комплексе с физиотерапевтическими методами лечения.

Передозировка. Не установлена.

Побочные эффекты.

Редко применение сока вызывает жжение в области раны. В таких случаях сок нужно развести 1-2 % раствором новокаина в соотношении 1:1. У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата могут развиваться проявления аллергических реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 мл, 20 мл во флаконах № 10 или № 1.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.