

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
№ _____
Регистрационное удостоверение

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АЛОЭ ЭКСТРАКТ
(ALOËS EXTRACTUM)

Состав:

действующее вещество: водный экстракт из свежих листьев алоэ древовидного – 1 мл.
вспомогательное вещество: натрия хлорид.

Лекарственная форма. Экстракт жидкий для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТС А16А Х.

Клинические характеристики.

Показания. Прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе невыясненной этиологии, нарушение функции печени, геморрой, нарушение функции почек, осложненные формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит. Период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы. При наличии осадка ампулу перед вскрытием встряхивают до образования равномерной взвеси. Алоэ экстракт вводят подкожно ежедневно: взрослым – по 1 мл (максимальная суточная доза - 3-4 мл); детям от 3 до 5 лет по 0,2-0,3 мл, старше 5 лет по 0,5 мл. Курс лечения – 30-50 инъекций. Повторные курсы проводят после двух или трех месяцев перерыва.

Побочное действие. Возможно появление: гипертермии, кожной сыпи, зуда, ощущения прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, диспепсии, боли в животе.

Передозировка. Не исследовалась.

Применение во время беременности или кормления грудью. Препарат не применяют, поскольку механизм его действия (как биогенного стимулятора) изучен недостаточно.

Дети. Применяют детям в возрасте от 3 лет.

Особенности применения.

Для предотвращения болезненности предварительно в место инъекции можно ввести 0,5 мл 2 % раствора новокаина. Перед применением новокаина следует сделать аллергическую пробу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не исследовалась.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Усиливает действие средств, стимулирующих гемопоэз, и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Стимулирует обмен веществ, ускоряет процессы регенерации, проявляет адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организму и стойкость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, повышает аппетит. Повышает энергетические запасы в сперматозоидах и усиливает их подвижность.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета, со специфическим запахом; допускается наличие взвеси, которая при хранении выпадает в осадок; при встряхивании ампулы осадок переходит в равномерную взвесь.

Несовместимость. Препарат нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 1 мл в ампуле. По 10 ампул в пачке.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель ОАО «БИОФАРМА»

Местонахождение. Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9.

Дата последнего пересмотра.