



UA.TR.039

**Інструкція із застосування медичного виробу**  
**капсули для вагінального застосування Біоспорин Феміна**  
Сертифікат відповідності № UA.TR.039.215-16

**Склад.** Одна капсула містить живі мікробні клітини *Bacillus subtilis* УКМ В-5007 та *Bacillus licheniformis* УКМ В-5514 в кількості не менше  $2 \cdot 10^9$  КУО;

**допоміжні речовини:** цукор кристалічний (сахароза), натрію цитрат, лактоза, целюлоза мікрокристалічна, кросповідон, кремнію діоксид, магнію стеарат.

**Форма випуску.** Капсули для вагінального застосування.

**Функціональні властивості.** *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* продукують антибіотикоподібні речовини та бактеріоцини, які виявляють високу антагоністичну активність до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, в тому числі стійких до дії антибіотиків. *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* активні по відношенню до грибів роду *Candida spp.* (в тому числі *Albicans*, а також *non-Albicans*), не впливають на представників нормальної мікрофлори піхви. *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* продукують дипіколінову кислоту, що сприяє нормалізації кислотності піхви та пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів. Завдяки дії біологічно активних компонентів *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* створюються умови для нормалізації та відновлення мікрофлори піхви. Після припинення використання виробу бактерії, що входять до складу Біоспорин Феміна, самостійно виводяться з організму.

Діє місцево, не має системної дії.

**Рекомендації щодо застосування.** Біоспорин Феміна рекомендований як допоміжний профілактично-гігієнічний засіб в комплексному застосуванні одночасно з засобами основної терапії:

- при запальних захворюваннях органів статеві системи у жінок для профілактики порушення нормальної мікрофлори піхви на тлі лікування основного захворювання;
- при вульвовагінальному кандидозі для відновлення нормальної мікрофлори на тлі основної терапії;
- при бактеріальному вагінозі в якості профілактично-гігієнічного засобу одночасно з основною терапією;
- з метою профілактики кандидозу піхви під час прийому антимікотичних препаратів;
- при рецидивуючому кандидозі як допоміжний засіб на тлі основного лікування для відновлення нормальної мікрофлори піхви;
- після проведених гінекологічних операцій, у післяопераційний період на тлі прийому антибактеріальних препаратів з метою профілактики розвитку вагінального кандидозу.

**Спосіб застосування.** Капсули застосовуються вагінально. Дорослим – по 1 капсулі 1 раз на добу протягом 5-10 днів.

Капсули вводяться глибоко в піхву в положенні лежачи на спині. Рекомендовано введення капсул перед сном. Тривалість застосування може бути змінена за рішенням лікаря. Видаляти пакувальний матеріал рекомендується безпосередньо перед введенням капсули.

**Особливості застосування.**

Застосування в період вагітності або годування груддю не вивчалися.

Можливі алергічні реакції у місці введення.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами.

**Не є лікарським засобом.**

**Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.**

**Протипоказання.** Гіперчутливість до компонентів виробу, діагностовані імунодефіцити із дефектом антитілоутворень та порушенням гуморальної ланки імунітету.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці у захищеному від світла місці при температурі від 2 до 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Пакування.** По 10 капсул у блістерній упаковці. По 1 блістеру у картонній пачці.

**Назва та повна адреса виробника.** ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА». Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37, тел.: (044) 277-36-10.

**Дата останнього перегляду** 13.12.2016