

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**31.01.12 № 59**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA/5711/01/01**

**ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**№ \_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ®**  
**(SPONGIA HAEMOSTATICA®)**

**Состав:**

*действующее вещество:* 1 бутылка содержит плазмы из донорской крови человека с образованным фибриновым сгустком, высушенной 0.8 г;

*вспомогательные вещества:* 4-(аминометил) бензойная кислота (Амбен), кальция хлорид гексагидрат.

**Лекарственная форма.** Сухое вещество.

**Фармакотерапевтическая группа.** Гемостатические средства для местного применения.  
Код АТС В02В С.

**Клинические характеристики.**

**Показания.** Местные капиллярные и паренхиматозные кровотечения, кровотечения из костей, мышц или тканей, кровотечения, локализованные на поверхности тела или в его полостях.

Носовые кровотечения, кровотечения из дёсен или кровотечения у больных с тромбоцитопенической пурпурой, лейкозом, геморрагическими тромбоцитопатиями, синдромом Ослера - Рандю, циррозом печени, хроническим нефритом.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы.**

Губку гемостатическую с амбеном применяют местно. Перед применением препарат достают из бутылки стерильным инструментом. Разовая доза зависит от характера и выраженности кровотечения: применяют от 1/4 части Губки до 3–4 Губок. После высушивания кровоточащего участка, его тампонируют кусочками Губки гемостатической с амбеном, прижимая их в течение 3-5 минут стерильным марлевым шариком. При выраженных кровотечениях Губку гемостатическую с амбеном прижимают к кровоточащей поверхности хирургическим инструментом с плоской полированной поверхностью, чтобы избежать потери части Губки, как это бывает в случае применения марлевого шарика. Для мягкой, более длительной тампонады Губка гемостатическая с амбеном может быть помещена в марлевый тампон. Тампоны извлекают через сутки.

**Побочные реакции.** Возможны аллергические реакции.

**Передозировка.** Не установлена.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Не исследовалось.

**Дети.** Применение детям не исследовалось.

**Особенности применения.** Применяют местно. Препарат также применяют при повышении фибринолитической активности.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе другими механизмами.** Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Не установлено.

### **Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика.**

Губка гемостатическая с амбеном относится к средствам, влияющим на систему свертывания крови. При местном применении препарат, содержащий фибрин и тромбин, активирует процессы свертывания, останавливает капиллярные и паренхиматозные кровотечения. Амбен имеет антифибринолитический эффект, подавляет фибринолиз путем конкурентного торможения плазминогенактивирующего фермента и угнетения образования плазмина.

**Фармакокинетика.** Не изучалась.

### **Фармацевтические характеристики.**

**Основные физико-химические свойства:** лиофилизированная гигроскопическая пористая масса белого с желтоватым или желтого с коричневым оттенком цвета с легким специфическим запахом.

**Срок годности.** 2 года.

### **Условия хранения.**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка.**

По 0,8 г препарата в бутылке, упакованной в пачку.

**Категория отпуска.** По рецепту.

### **Производитель.**

ЧАО «БИОФАРМА».

### **Местонахождение**

Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9.

**Дата последнего пересмотра.**