

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**№ \_\_\_\_\_**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ \_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**СИЛИКС**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* субсил (кремния диоксид);

1 бутылка содержит - 12 г,

1 стик содержит – 1 г,

1 пакетик содержит – 1 г или 2 г.

**Лекарственная форма.** Порошок для оральной суспензии.

Рыхлый порошок белого или белого с голубых оттенком цвета, без запаха.

**Название и местонахождение производителя.**

ОАО «Биофарма».

Украина, 03038, г. Киев-38, ул. Н.Амосова, 9.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Энтеросорбенты. Код АТС А07В С10.

Препарат сорбционного действия. Путем адсорбции связывает и выводит из организма токсины экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в кишечнике.

Препарат практически не всасывается из кишечника.

**Показания к применению.**

Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся диарейным синдромом (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции); в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В.

**Противопоказания.**

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистых оболочек тонкого и толстого отделов кишечника, непроходимость кишечника. Детский возраст до 1 года.

**Надлежащие меры безопасности при применении.**

Запрещается применение через рот сухого порошка. Перед каждым приемом готовую суспензию слегка взбалтывают.

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью в связи с отсутствием данных о применении.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не влияет.

**Дети.** Не назначают детям в возрасте до 1 года в связи с отсутствием данных о применении.

**Способ применения и дозы.**

Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до употребления пищи или применения лекарственных средств.

Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию Силикс вводят в желудок через зонд.

Для приготовления суспензии охлажденную кипяченую воду в количестве 250 мл добавляют в бутылку, которая содержит 12 г препарата (воду доводят до метки на бутылке «250 мл» и слегка взбалтывают); 20 мл полученной суспензии (полная столовая ложка) содержит приблизительно 1 г препарата.

При использовании пакетированной формы препарат из стика (1 г) или пакетика (1 г или 2 г) высыплют в стакан потом к нему добавляют охлажденную кипяченую воду из расчета 20 мл на 1 г препарата и слегка взбалтывают.

Суточная доза препарата для детей составляет:

- детям в возрасте 1 - 3 года – 1-2 г;
- детям в возрасте 4 – 7 лет – 2-3 г;
- детям в возрасте 8 – 10 лет – 4-5 г;
- детям в возрасте 11 – 13 лет – 5-6 г;
- детям в возрасте 14 – 15 лет – 7-8 г;
- детям в возрасте 16 – 18 лет – 9-10 г.

Суточная доза препарата для взрослых составляет 12 г.

Суточную дозу препарата в виде суспензии дети и взрослые должны принимать в 3 приема.

Приготовленную суспензию следует хранить при температуре от 2 °С до 8 °С не более 24 часов.

При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы, которая не превышает половину суточной нормы. Курс лечения -3- 5 суток; при необходимости может быть увеличен до 10-15 суток.

Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7-10 дней и зависит от тяжести течения заболевания.

#### **Передозировка.**

О случаях передозировки сообщений не было. При приеме препарата в завышенных дозах может наблюдаться осложнение испражнений.

#### **Побочные эффекты.**

В единичных случаях возможна временная задержка испражнений.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** При одновременном применении препарата и ацетилсалициловой кислоты усиливается прогресс дезагрегации тромбоцитов. Силикс применяют за 1 час до употребления пищи или применения других лекарственных средств.

**Срок годности.** 3 года.

Приготовленная суспензия хранится в течении 24 часа при температуре от 2 °С до 8 °С.

#### **Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Упаковка.**

По 1 г препарата в стике или пакетике или по 2 г препарата в пакетике, или по 12 г препарата в бутылке.

По 24 стика или 24 пакетика, или 1 бутылке в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**