

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**

**СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО**  
**(VITREOUS HUMOR)**

***Состав:***

*действующее вещество:* 1 ампула содержит 2 мл жидкости, которую получают из замороженного стекловидного тела глаз разных видов убойного скота (крупного рогатого скота, свиней, коз).

**Лекарственная форма.** Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная или слегка опалесцирующая, или слегка желтоватого цвета жидкость. При хранении допускается образование мелкой взвеси.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТХ А16А Х.

***Фармакологические свойства.***

***Фармакодинамика.***

Препарат имеет биостимулирующее действие, ускоряет процессы регенерации тканей, способствует улучшению процессов обмена, имеет стимулирующее влияние на образование костной мозоли. Имеет неспецифическое десенсибилизирующее и обезболивающее действие при невралгиях, фантомной боли, радикулитах и других заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающейся болевым синдромом. Смягчает рубцовую ткань и способствует ее рассасыванию.

***Фармакокинетика.***

Не изучалась.

**Клинические характеристики.**

***Показания.***

Нервное и физическое переутомление, астенизация, алиментарная и инфекционная дистрофия, невриты, полиневриты, радикулиты, невралгии, фантомные боли, для профилактики чрезмерного разрастания соединительной ткани в раннем послеоперационном периоде, размягчение и рассасывание рубцовой ткани, лечение ожоговых, послеоперационных, келоидных и другого происхождения больших рубцов, при контрактурах суставов, при кератитах, для ускорения образования костной мозоли при переломах, язвах и ожогах роговицы (в регрессивном периоде), а также при травмах глаз.

***Противопоказания.***

Инфекционные заболевания, острые воспалительные процессы, кахексия, нефрит, нефросклероз, цирроз печени, застойная сердечная недостаточность с отеками, злокачественная опухоль, гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

***Взаимодействие с другими лекарственными средствами или другие виды взаимодействий.***

Не установлена.

***Особенности применения.***

При появлении аллергической реакции препарат следует отменить. Эффект наблюдается при длительном (не менее 8-10 дней) применении.

***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Не исследовалось.

***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.***

Не исследовалась.

***Способ применения и дозы.***

Стекловидное тело вводить подкожно и под конъюнктиву.

Применять для лечения взрослых по 2 мл ежедневно: курс лечения при контрактурах, рубцах – до 25 дней, при невралгиях – 8-10 дней.

Субконъюнктивально взрослым вводить по 0,3-0,5 мл. Курс лечения – 10 дней.

***Дети.***

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому препарат не применять в педиатрической практике.

***Передозировка.***

Не отмечалась в связи с низкой токсичностью препарата.

***Побочные реакции.***

Возможны реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, анафилактические реакции. Возможны реакции в месте введения, в том числе боль и воспаление. В случае появления аллергической реакции препарат следует отменить.

***Срок годности.*** 2 года.

***Условия хранения.*** Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

***Несовместимость.*** Нет информации о несовместимости препарата.

***Упаковка.*** По 2 мл в ампулах № 10, №10 (5x2) у блістерах.

***Категория отпуска.*** По рецепту.

***Производитель.*** ЧАО «БИОФАРМА».

***Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.***  
Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9.

***Дата последнего пересмотра.***